

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒	
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 皮下注射		●
	IN フェスゴ配合皮下注 （ペルツマブ 1200mg/body, トラスツスマブ 600mg/body）	15m L	
	ワンショット：1日1回 大腿部に皮下投与 初回は8分以上かけて		
注射	3 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	4 点滴注射		●
	ドセタキセル注 （75mg/m ² ）	75mg / m ²	
	生理食塩液注 250 mL（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 1 時間で		
注射	5 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=6）	0mg / A	
	5%ブドウ糖注 250 mL	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 mL	1瓶	
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10 分で		