

レジメン名称：P23-401 PHESGO/DTX/CBDCA triweekly（2コース目以降） 休薬期間：21日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒	
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 皮下注射		●
	MA フェスゴ配合皮下注 （ペルツマブ 600mg/body, トラスツマブ 600mg/body）	10mL	
	ワンショット：1日1回 大腿部に皮下投与 2回目以降、5分以上かけて		
注射	3 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg / 1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	ドセタキセル注 （75mg/m ² ）	75mg / m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 1時間で		
注射	5 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=6）	0mg / A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		