

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l【要時】ロック付 ヘパリンNaバッグ用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンバッグ） ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg / 1m l ポララミン注 5mg / 1m l アロカリス注 235mg / 10m L アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg g 1A 1瓶 1袋	●	
注射	3	点滴注射 アービタックス注 （初回のみ400mg/m ² ） 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回：120分	400mg g / m ² 500m L	●	
注射	4	点滴注射（リザーバーより） 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 15分で	1瓶	●	
注射	5	点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 （200mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 120分で	200mg g / m ² 250m L	●	
注射	6	点滴注射（リザーバーより） イリノテカン注 （150-180mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で	150mg g / m ² 250m L	●	
注射	7	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （400mg/m ² ） 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4分で	400mg g / m ² 50m L	●	
注射	8	点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射	9	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （2400mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100m l（PG） （全量140m lに調製） 点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で	2400mg g / m ² 1瓶	●	
注射	10	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg / 1m l ポララミン注 5mg / 1m l 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg g 1A 100m L		●
注射	11	点滴注射 アービタックス注 （250mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で	250mg g / m ² 250m L		●
注射	12	点滴注射（リザーバーより） 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 15分で	1瓶		●