

レジメン名称：C15-205 Cmac weekly/CPT-11 biweekly（2コース目以降） 休薬期間：14日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (リザーバーフラッシュ用) (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		ボララミン注 5mg/1mL	1A		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	4	点滴注射		●	
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	5	点滴注射		●	
		イリノテカン注 (150-180mg/m ²)	150mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	6	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	7	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		ボララミン注 5mg/1mL	1A		
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8	点滴注射			●
		アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	9	点滴注射			●
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 15分で			