

化学療法(HD-MTX)を受けられる患者さまへ クリニカルパス・入院療養計画書

様

@SYSDATE4@

月 日	/			/		
	投与1日目			投与2~5日目		投与6日目以降
	化学療法前	化学療法投与中	化学療法投与後	化学療法 翌日		
検査	・朝食前に体重測定をおこなってください	・尿量を測定して下さい	・尿量を測定して下さい	・適宜、血液検査をします ・尿量を測定して下さい ・朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては利尿剤の処置が必要になります)	・適宜、血液検査をします ・尿量を測定して下さい ・朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては利尿剤の処置が必要になります)	
治療 ・処置	・本日からバクタの内服は中止です ・副作用を抑えるための点滴を行います ・利尿剤の内服があります ・薬剤師は医師と情報共有して、薬物療法を安全に進めています。	・尿量を測定して下さい ・化学療法薬(メソトレキセート)を24時間かけて点滴します ・利尿剤の内服があります	・尿量を測定して下さい ・終了後も水分の点滴が続きます ・利尿剤の内服があります	・化学療法の副作用を中和するお薬(ロイコボリン)の点滴(1日4回)があります ・終了後も水分の点滴が続きます ・利尿剤の内服があります	・血液検査の結果によっては、以降もロイコボリンの点滴が必要になることがあります ・バクタの内服が再開の場合は説明します	
行動	・制限はありません	・制限はありません	・制限はありません	・制限はありません	・制限はありません	
清潔	化学療法薬(メソトレキセート)投与中のシャワー浴はできるだけ避けてください			・メソトレキセート終了後、シャワー浴が可能です	・制限はありません	
食事	・パンフレットに沿った食事を心がけて下さい ・病院食や食べ物のことで困ることがあれば、看護師に相談して下さい ・必要にあわせて栄養士が相談に乘ります ・水分をとるように心がけて下さい			・吐き気があつたり食欲が落ちたりすることがあります ・体の調子に合わせてお食事をとってください ・病院食で困ることがあれば相談して下さい ・水分をとるように心がけて下さい		
説明 ・指導	・看護師より化学療法についてお話しします ・副作用(吐気・嘔吐・口内炎・下痢・頭痛など)の症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい ・点滴中、点滴のまわりや血管が痛むことがあればすぐに知らせて下さい ・ダイアモックス内服中は頻尿になります ・抗がん剤を投与当日朝～翌日朝までは尿量を測定し、食事箋に記録して下さい ・お薬の投与1週間前後より口内炎ができることがありますので、うがい薬でのうがいを習慣にして下さい			・看護師より化学療法についてお話しします ・副作用(吐気・嘔吐・口内炎・下痢・頭痛など)の症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい ・点滴中、点滴のまわりや血管が痛むことがあればすぐに知らせて下さい ・ダイアモックス内服中は頻尿になります ・抗がん剤を投与当日朝～翌日朝までは尿量を測定し、食事箋に記録して下さい ・お薬の投与1週間前後より口内炎ができることがありますので、うがい薬でのうがいを習慣にして下さい		