

化学療法(リツキサンのみ)新投与方法を受けられる患者さまへ クリニカルパス・入院療養計画書

様

月日	リツキサン投与1日目			投与2日目
	化学療法前	化学療法投与中	化学療法投与後	化学療法 翌日
検査				<ul style="list-style-type: none"> <li>適宜、血液検査をします</li> <li>朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては処置が必要になることがあります)</li> </ul> 
お薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>リツキサン投与の30分前にカロナールを内服してください (※ 内服時間 : )</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>薬剤師は医師と情報共有して、薬物療法を安全に進めていきます。</li> </ul>		
治療・処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>副作用を抑えるための点滴を行います</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リツキサンの投与は約4時間程度かかります (初回投与とそうでない場合は時間が異なります)</li> <li>リツキサン投与中はの輸液ポンプを使用します</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>終了後も水分の点滴が続きます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水分摂取ができれば点滴は終了です</li> </ul>
行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>リツキサン投与中はできるだけお部屋で過ごすようにしてください</li> <li>トイレでベッドを離れるときにはポンプの充電プラグを抜き、戻ったらすぐに充電を開始してください</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません</li> </ul> 
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴を行う場合はリツキサン投与前か投与後に行うようにし、投与中のシャワー浴は避けてください</li> <li>点滴は看護師が防水処置を行いますのでシャワー浴の時間を相談してください</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません</li> </ul>
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>パンフレットに沿った食事を心がけて下さい</li> <li>病院食や食べ物のことで困ることがあれば、看護師に相談して下さい</li> <li>必要にあわせて栄養士が相談にのります。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>吐き気があったり食欲が落ちたりすることがあります</li> <li>体の調子に合わせてお食事をとってください</li> <li>病院食で困ることがあれば相談して下さい</li> </ul>
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> <li>看護師より化学療法についてお話しします</li> <li>リツキサンには発熱・頭痛・悪寒(震え)・かゆみ・吐気・発疹・咳や息苦しさ・動悸などの副作用があります。 <u>副作用は開始直後や、点滴速度を速めた時に起こることがあります。これらの症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい。</u></li> <li>点滴中、点滴のまわりや血管が痛むことがあればすぐに知らせて下さい</li> <li>副作用を抑える点滴をすると眠くなる場合があります。歩行時にはふらつきに注意しましょう。</li> <li>手洗い、うがい薬でのうがいをおこない、身のまわりを清潔に整えましょう。</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>手洗い、うがい薬でのうがいをおこない、身のまわりを清潔に整えましょう。</li> </ul>